

Anticonceptivos orales combinados

ESTRÓGENO + PROGESTÁGENO


Actúan inhibiendo el eje hormonal que permite la ovulación en cada ciclo.

Existen diferentes tipos de progestágenos sintéticos que pueden componer este tipo de anticonceptivos (dienogest, drospirinona, levonorgestrel, ciproterona, etc.) El componente de estrógeno está dado por el etinilestradiol o valerato de estradiol.

¿QUIÉNES NO LAS PUEDEN TOMAR?

Personas fumadoras, en las primeras 6 semanas posparto, en hipertensas, diabéticas, antecedentes de migraña con aura o sin aura en mayores de 35 años, cáncer de mama, enfermedad hepática, obesas, antecedente de trombosis, enfermedad vascular.

¿QUÉ TAN EFECTIVOS SON Y CUÁL ES SU PRESENTACIÓN?




7 embarazos de cada 100 usuarias con uso habitual.

Presentación: Tabletas por 28 días en esquemas 24 activas y 4 placebo, 21 activas 7 placebo o solo 21 activas. Diferentes dosis según la marca.

Efectos adversos: dolor de cabeza, náuseas, vómito sangrado irregular, mareo y en casos muy raros coágulos sanguíneos en venas profundas de las piernas o pulmón (trombosis venosa profunda/ tromboembolismo pulmonar.), accidente cerebrovascular o infarto del corazón.



¿Cómo se toman?



Deben tomarse a la misma hora todos los días, en caso de olvidarla se debe tomar tan pronto como recuerdes pero si pasan más de 12 horas esta perderá su efectividad y se deberá usar protección adicional, sin embargo siempre ver el inserto de la caja y seguir sus instrucciones.

Recuerda siempre consultar al médico para consejería en anticoncepción y elegir el método con el que te sientas más cómoda. Si deseas orientación virtual puedes solicitarla en mentes colectivas.

Conoce más en este video

