

CUIDADO ORAL DE BEBÉS CON HENDIDURAS LABIO PALATINAS ENTRE 0-6 MESES


Equipo Interdisciplinario para el Manejo de Pacientes con LPH

Facultad de Odontología
Pontificia Universidad Javeriana



LABIO Y/O PALADAR HENDIDO (LPH)

El labio y/o paladar hendido (LPH) es una de las anomalías de cabeza y cuello más comunes en nuestros países.



¿QUE LA PRODUCE?

Las causas son multifactoriales que quiere decir: genes, medio ambiente y la raza.



BEBÉ CON LPH

El nacimiento con un bebé debe de recibirse de la mejor manera procurando manejo interdisciplinario.



APOYO PARA LA FAMILIA

Una de las primeras prioridades es que el bebé se alimente correctamente y sea preparado para la cirugía del labio. Siempre apoyate en los profesionales para guiar este proceso.



INFOGRAFÍA ELABORADA POR

Dra. Sarah Villalobos
Posgrado de Odontopediatria

DIRIGIDA POR

Dra. María del Pilar Bernal

FUENTES

MARINA MOSCARDINI VILELA; STEPHANIE DÍAZ HUAMÁN; MOARA DE ROSSI; PAULO NELSON-FILHO; ANDIARA DE ROSSIODONTOLÓGIA PARA BEBÉS: UNA POSIBILIDAD PRÁCTICA DE PROMOCIÓN DE SALUD BUCALREVISTA DE ODONTOPEDIATRÍA LATINOAMERICANAVOLUMEN 7, NO. 2, AÑO 2017.WWW.NICKLAUSCHILDRENS.ORG/TREATMENTS/NASOALVEOLAR-MOLDING-(NAM)-TREATMENTWWW.NATIONWIDECCHILDRENS.ORG/FAMILY-RESOURCES-EDUCATION/HEALTH-WELLNESS-AND-SAFETY-RESOURCES/HELPING-HANDS/NASOALVEOLAR-MOLDING-NASABANTO J, REZENDE KMPC, CARVALHO TS, CORRÊA FNP, VILELA T, BÖNECKER M, ET AL. EFFECTIVENESS OF TOOTH WIPES IN REMOVING BABIES' DENTAL BIOFILM. ORAL HEALTH AND PREVENTIVE DENTISTRY

CUIDADO ORAL DE BEBÉS CON HENDIDURAS LABIO PALATINAS ENTRE 0-6 MESES

Equipo Interdisciplinario para el Manejo de Pacientes con LPH

Facultad de Odontología
Pontificia Universidad Javeriana



HIGIENE ORAL

Los padres tienen la posibilidad de introducir los hábitos de higiene diaria en una etapa temprana.

SE INICIA CON MASAJES GINGIVALES Y LIMPIEZA PARA ESTABLECER UNA MICROBIOTA BUCAL SALUDABLE Y ASI DISMINUIR LA PREVALENCIA DE CARIES

¿CÓMO?

Se debe realizar mediante el uso de dedales, gasas suaves o paños esteriles envueltos en el dedo índice.

¿CUÁNDO?


Realizar la higiene oral una vez al día, antes de dormir, durante o después del baño para que el niño la asocie a la higiene corporal durante toda la vida.

BEBÉS EDENTULOS

Si tu bebé no tiene dientes, se debe limpiar con gasa estéril todos los rebordes, lengua y incluyendo la zona de la hendidura

BEBÉS CON DIENTES

El objetivo inicial del cepillado es establecer buen patrón de higiene bucal, fortaleciendo la remoción mecánica de bacterias de zonas accesibles



CEPILLADO DENTAL

Desde la erupción de cualquier diente se debe cepillar usando crema dental fluorada (minimo 1100ppm)

INFOGRAFÍA ELABORADA POR

Dra. Sarah Villalobos
Posgrado de Odontopediatria

DIRIGIDA POR

Dra. María del Pilar Bernal

FUENTES

MARINA MOSCARDINI VILELA; STEPHANIE DÍAZ HUAMÁN; MOARA DE ROSSI; PAULO NELSON-FILHO; ANDIARA DE ROSSIODONTOLÓGIA PARA BEBÉS: UNA POSIBILIDAD PRÁCTICA DE PROMOCIÓN DE SALUD BUCALREVISTA DE ODONTOPEDIATRÍA LATINOAMERICANAVOLUMEN 7, NO. 2, AÑO 2017.WWW.NICKLAUSCHILDRENS.ORG/TREATMENTS/NASOALVEOLAR-MOLDING-(NAM)-TREATMENTWWW.NATIONWIDECCHILDRENS.ORG/FAMILY-RESOURCES-EDUCATION/HEALTH-WELLNESS-AND-SAFETY-RESOURCES/HELPING-HANDS/NASOALVEOLAR-MOLDING-NASABANTO J, REZENDE KMPC, CARVALHO TS, CORRÊA FNP, VILELA T, BÖNECKER M, ET AL. EFFECTIVENESS OF TOOTH WIPES IN REMOVING BABIES' DENTAL BIOFILM. ORAL HEALTH AND PREVENTIVE DENTISTRY

CUIDADO ORAL DE BEBÉS CON HENDIDURAS LABIO PALATINAS ENTRE 0-6 MESES

Equipo Interdisciplinario para el Manejo de Pacientes con LPH

Facultad de Odontología
Pontificia Universidad Javeriana



OBTURADORES



Si a tu bebé se le indican obturadores y moldeadores nasoalveolares se recomienda la colocación desde primeras 72 horas de vida hasta antes de su cirugía.

BUSCAN AYUDAR A REPARAR Y MOLDEAR EL LABIO Y NARIZ DEL NIÑO, MEJORAR LA ALIMENTACION Y REDUCIR LAS CIRUGIAS FUTURAS

¿LE INCOMODA A MI BEBÉ?

Usualmente no le va a incomodar pero en casos que tu bebé se muestre incomodo, llore o persista inquieto, será necesario los controles con tu odontopediatra para verificar si existen molestias.

¿CÓMO SE USA?

El bebé usará el obturador todo el tiempo, hasta para comer. Después de los primeros días, se debería acostumbrar al aparato.

CUIDADOS DEL OBTURADOR

UNA VEZ AL DIA

- Se debe sacar de la boca del bebé y limpiar con agua tibia, un cepillo de dientes y jabón antibacterial.
- Antes de volver a colocarlo en la boca del bebé se deben buscar zonas ásperas que puedan molestarle la lengua o las encías.



EVITAR

No colocar el obturador con agua hirviendo ni en el microondas porque se puede derretir.
No lavar con crema dental.

OBTURADORES FIJOS

Si la aparatología esta fija en la boca del bebé, se puede higienizar con aire a presión usando una jeringa para lograr eliminar residuos

INFOGRAFIA ELABORADA POR

Dra. Sarah Villalobos

Posgrado de Odontopediatria

DIRIGIDA POR

Dra. María del Pilar Bernal

FUENTES

MARINA MOSCARDINI VILELA; STEPHANIE DÍAZ HUAMÁN; MOARA DE ROSSI; PAULO NELSON-FILHO; ANDIARA DE ROSSIODONTOLÓGIA PARA BEBÉS: UNA POSIBILIDAD PRÁCTICA DE PROMOCIÓN DE SALUD BUCALREVISTA DE ODONTOPEDIATRÍA LATINOAMERICANAVOLUMEN 7, NO. 2, AÑO 2017.WWW.NICKLAUSCHILDRENS.ORG/TREATMENTS/NASOALVEOLAR-MOLDING-(NAM)-TREATMENTWWW.NATIONWIDECCHILDRENS.ORG/FAMILY-RESOURCES-EDUCATION/HEALTH-WELLNESS-AND-SAFETY-RESOURCES/HELPING-HANDS/NASOALVEOLAR-MOLDING-NASABANTO J, REZENDE KMPC, CARVALHO TS, CORRÊA FNP, VILELA T, BÖNECKER M, ET AL. EFFECTIVENESS OF TOOTH WIPES IN REMOVING BABIES' DENTAL BIOFILM. ORAL HEALTH AND PREVENTIVE DENTISTRY

CUIDADO ORAL DE BEBÉS CON HENDIDURAS LABIO PALATINAS ENTRE 0-6 MESES

Equipo Interdisciplinario para el Manejo de Pacientes con LPH

Facultad de Odontología
Pontificia Universidad Javeriana



EN LOS BEBÉS CON LPH PODEMOS ENCONTRAR DIENTES NATALES Y NEONATALES



DIENTES NATALES

Son dientes que pueden estar presentes en la cavidad oral desde el momento del nacimiento

DIENTES NEONATALES

Dientes que erupcionan entre los primeros treinta días después del nacimiento



¿SON NORMALES?

No son comunes, pero normales. Casi siempre aparecen en la mandíbula, tienen poca raíz y están adheridos al borde de la encía.

¿SE TIENEN QUE EXTRAER?

Se realiza si el diente no está bien implantado y es excesivamente móvil por riesgo de aspiración y si molesta o lastima la lengua de tu bebé a la hora de la lactancia.



INFOGRAFIA ELABORADA POR

Dra. Sarah Villalobos
Posgrado de Odontopediatría

DIRIGIDA POR

Dra. María del Pilar Bernal

FUENTES

MARINA MOSCARDINI VILELA; STEPHANIE DÍAZ HUAMÁN; MOARA DE ROSSI; PAULO NELSON-FILHO; ANDIARA DE ROSSIODONTOLÓGIA PARA BEBÉS: UNA POSIBILIDAD PRÁCTICA DE PROMOCIÓN DE SALUD BUCALREVISTA DE ODONTOPEDIATRÍA LATINOAMERICANAVOLUMEN 7, NO. 2, AÑO 2017.WWW.NICKLAUSCHILDRENS.ORG/TREATMENTS/NASOALVEOLAR-MOLDING-(NAM)-TREATMENTWWW.NATIONWIDECILDRENS.ORG/FAMILY-RESOURCES-EDUCATION/HEALTH-WELLNESS-AND-SAFETY-RESOURCES/HELPING-HANDS/NASOALVEOLAR-MOLDING-NASABANTO J, REZENDE KMPC, CARVALHO TS, CORRÊA FNP, VILELA T, BÖNECKER M, ET AL. EFFECTIVENESS OF TOOTH WIPES IN REMOVING BABIES' DENTAL BIOFILM. ORAL HEALTH AND PREVENTIVE DENTISTRY

CUIDADO ORAL DE BEBÉS CON HENDIDURAS LABIO PALATINAS ENTRE 0-6 MESES

Equipo Interdisciplinario para el Manejo de Pacientes con LPH

Facultad de Odontología
Pontificia Universidad Javeriana



CIRUGÍA

Los bebés deberán cumplir los parámetros según el cirujano del equipo para ser considerados para el procedimiento.

SON REALIZADAS NORMALMENTE ENTRE LOS 6 Y 18 MESES DE VIDA.

HIGIENE POSTERIOR A LA CIRUGÍA

¿COMO REALIZAR LA HIGIENE?

Es importante que realizar la higiene con una gasa esteril, limpiando muy bien la zona de la herida



MASAJES DEL LABIO

masajes suaves en el labio para el manejo del queloide, una vez indicado por los profesionales



PARA RECORDAR

- Lo más importante son los controles a tu ODP para que puedan aconsejar y verificar el progreso de tu bebé
- La higiene se realiza con gasas esteriles o dedales y a la erupción del primer diente se debe usar cepillo y crema fluorada
- Si la lactancia materna fue posible recuerda que debe ser exclusiva hasta los 6 meses de edad y sino deben de seguirse las indicaciones del equipo interdisciplinario

INFOGRAFIA ELABORADA POR

Dra. Sarah Villalobos
Posgrado de Odontopediatria

DIRIGIDA POR

Dra. María del Pilar Bernal

FUENTES

MARINA MOSCARDINI VILELA; STEPHANIE DÍAZ HUAMÁN; MOARA DE ROSSI; PAULO NELSON-FILHO; ANDIARA DE ROSSIODONTOLOGÍA PARA BEBÉS: UNA POSIBILIDAD PRÁCTICA DE PROMOCIÓN DE SALUD BUCALREVISTA DE ODONTOLOGÍA LATINOAMERICANA VOLUMEN 7, NO. 2, AÑO 2017. [WWW.NICKLAUSCHILDRENS.ORG/TREATMENTS/NASOALVEOLAR-MOLDING-\(NAM\)-TREATMENT](http://WWW.NICKLAUSCHILDRENS.ORG/TREATMENTS/NASOALVEOLAR-MOLDING-(NAM)-TREATMENT) WWW.NATIONWIDECHILDRENS.ORG/FAMILY-RESOURCES-EDUCATION/HEALTH-WELLNESS-AND-SAFETY-RESOURCES/HELPING-HANDS/NASOALVEOLAR-MOLDING-NASABANTO J, REZENDE KMPC, CARVALHO TS, CORRÊA FNP, VILELA T, BÖNECKER M, ET AL. EFFECTIVENESS OF TOOTH WIPES IN REMOVING BABIES' DENTAL BIOFILM. ORAL HEALTH AND PREVENTIVE DENTISTRY